

INCOMPATIBILIDADES: No mezclar **Preside® 80 WG** con productos de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: En achicoria industrial no aplique más que 55 ó 75 g/ha si en la rotación próxima se consideran cultivos susceptibles o resistentes respectivamente.

Deberán transcurrir 12 meses entre su aplicación y la siembra de crucíferas como raps, col forrajera y remolacha. Puede producirse amarillamiento y eventuales reducciones en la altura de alfalfa y tréboles, principalmente bajo condiciones de estrés, ya sea hídrico o térmico.

TIEMPO DE REINGRESO: Esperar 12 horas después de realizada la aplicación, para reingresar personas ó animales domésticos al área tratada. Esperar 7 días para reingresar animales de pastoreo a praderas tratadas.

NUMERO MÁXIMO DE APLICACIONES: En Achicoria industrial máximo 5 aplicaciones por temporada, con un intervalo de 7 - 12 días entre cada una de ellas. En el resto de los cultivos recomendados, una aplicación por temporada.

En la naturaleza existe la posibilidad de ocurrencia de biotipos resistentes a herbicidas, esto puede ocurrir a **Preside® 80 WG** como a otros herbicidas de su mismo grupo químico, a través de una variación genética normal (mutación) en cualquier población de malezas. En estos casos el uso repetido de este grupo de herbicidas puede llevar a estos biotipos de malezas a ser dominantes por lo que la población de malezas será de difícil control. La ocurrencia de poblaciones resistentes es difícil de detectar antes de la aplicación de **Preside® 80 WG** por lo que Dow AgroSciences no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de estas malezas resistentes. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico. Dow AgroSciences garantiza la calidad y contenido del ingrediente activo señalado en esta etiqueta hasta que el producto salga de su control directo. Debido a que la acción de un plaguicida puede resultar influenciada por diversos factores, no se asume responsabilidad alguna por eventuales daños de cualquier naturaleza, derivadas de su uso, manipulación o almacenaje.

Marzo 2017

DOW Dow AgroSciences
Herbicida
Preside® 80WG
GRÁNULOS DISPERSIBLES (WG)

Contenido por Envase

Flumetsulam* 80%p/p (800 g/kg)
Cofomulantes c.s.p 100% p/p (1 kg)
*2',6'-difluoro-5-metil [1,2,4] triazolo [1,5-a] pirimidin-2-sulfonamida.

Preside® 80 WG es un herbicida de acción pre o post emergente, absorbido por hojas y raíces. Selectivo a gramíneas y leguminosas. Está indicado para el control de malezas de hoja ancha en achicoria industrial, trigos solos o asociados y en praderas asociadas de tréboles y leguminosas así como en semilleros de estas especies, según se indica en las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3346

Número de lote o partida:

Fecha vencimiento, mes y año:

Nombre y dirección del fabricante: Dow AgroSciences Argentina S.R.L., Hipólito Yrigoyen 2900 (S2202DRA) Puerto General San Martín, Provincia de Santa Fe, Argentina. y/o Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, Estados Unidos.

Nombre y dirección del importador: Dow AgroSciences Chile S.A., Américo Vespucio 100, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.

Contenido neto: 5 bolsas hidrosolubles x 25 g c/u. Total 125 g.

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

* Marca registrada de The Dow Chemical Company ("Dow") o de una compañía afiliada de Dow
* Marca registrada de Dow AgroSciences

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

GRUPO QUÍMICO: Flumetsulam pertenece al grupo químico de las triazolpirimidinas.

Preside® 80 WG no debe ingerirse ni inhalarse. Debe evitarse su contacto con los ojos y la piel. Durante la manipulación del producto, usar guantes impermeables, delantal impermeable, protector facial y botas de goma. Durante la aplicación, usar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable y protector facial. No fumar, comer ni beber durante la manipulación y aplicación del producto.

Almacenaje: Almacenar en lugar ventilado, fresco y seco, en su envase original bien cerrado. Mantener fuera del alcance de niños y personas no responsables. No se almacene en el mismo lugar con herbicidas volátiles. No almacenar con comestibles, alimento para animales, o semillas.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por la baja toxicidad del producto, no existen síntomas de intoxicación descritos.

PRIMEROS AUXILIOS: En cualquier caso, llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de salud a cargo. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice **lentes de contacto**, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. En caso de **contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. En caso de **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llevar inmediatamente a un centro asistencial. En caso de **Inhalación:** Llevar a la persona al aire fresco. Consulte un médico.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No existe un antídoto específico

EN CASO DE INGESTION O INTOXICACION LLAMAR AL (2) 2635 3800 CONVENIO CITUC/AIPA O AL (2) 2247 3600 CITUC EMERGENCIAS QUIMICAS, EN CASO DE ACCIDENTE. TELÉFONOS DE EMERGENCIA - ATENCION LAS 24 HORAS. CONSULTAS DOW AGROSCIENCES 2440 4800

Preside® 80 WG es de baja peligrosidad en abejas, aves y peces.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR LOS ENVASES Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES, O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

00117291-08-17-01

INSTRUCCIONES DE USO:

Características y forma de acción del producto: Inhibe la acetolactato sintetasa (ALS), una enzima fundamental en la síntesis de amino ácidos como isoleucina, leucina y valina.

Preside® 80 WG puede ser usado en praderas asociadas o semilleros de leguminosas (trébol blanco y rosado) y ballicas anuales, bianuales o perennes. Se necesita una adecuada humedad en el suelo para que el herbicida pueda ejercer su efecto. Utilizar dosis mayores en presencia de malezas de mayor desarrollo.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Dosis g/ha	Observaciones	Malezas controladas	Carencia días*
Trigo	25	Aplicar desde las 3-4 hojas verdaderas hasta fin de macolla. No tiene antagonismo con graminicidas.	Yuyo, rábano, quilloi quilloi, bolsa del pastor	15
Praderas asociadas de trébol y ballicas	50-75	Aplicar sobre malezas en sus primeros estados, de 2 a 3 hojas. Usar las dosis menores en siembras primaverales. Tréboles: Puede ser aplicado a partir del tercer par de hojas trifoliadas. En praderas de 2 año con trébol rosado, no aplique mas de 62.5 g/ha.	Yuyo, rábano, quilloi-quilloi, bolsa del pastor calabacillo, pasto pinito, berro, manzanillon, manzanilla, crepis, vinagrillo, sanguinaria siete venas	
Semilleros de ballicas	50-75	Ballicas: A partir de la tercera hoja expandida.		
Semilleros de trébol	50-62.5			
Alfalfa	40-50	Puede ser aplicado a partir del segundo par de hojas trifoliadas. Evitar aplicar sobre alfalfa en condiciones de estrés. Puede producirse un amarillamiento que desaparece sin afectar rendimiento. Aplicar sobre malezas en sus primeros estados, creciendo activamente.		
Achicoria Industrial	10-20	Aplicar 10 g/ha cuando 30 % de la achicoria ha emergido. Las siguientes aplicaciones se realizarán con una frecuencia de 7-12 días	Yuyo, rábano, quilloi quilloi, bolsa del pastor	60

PREPARACIÓN DE LA ASPERSIÓN: Llene el estanque hasta la mitad, haga una premezcla con la cantidad de **Preside® 80 WG** necesaria, y agitando complete el volumen de agua necesario. Usar mojamientos de 100 – 300 L/ha para todos los cultivos recomendados.

COMPATIBILIDADES: En trigo puede ser mezclado con Metsulfuron o Combo® para ampliar espectro de control. En alfalfa, praderas asociadas de trébol y ballicas y en trigos asociados con leguminosas se puede aplicar Preside® con Vencweed Extra 100.



CUIDADO

